

Análisis Real I
Posgrado en Matemáticas
Universidad Nacional Autónoma de México
Examen 3

Profesor: Gerardo Hernández Dueñas

Diciembre 8, 2017

- * POR FAVOR ESCRIBE TU NOMBRE EN CADA HOJA**
- * EXPLICA TU RESPUESTA E INCLUYE LOS DETALLES**

NUMERO TOTAL DE PAGINAS: 9

TU NOMBRE:

Prob 1 /40	
Prob 2 /20	
Prob 3 /20	
Prob 4 /20	
TOTAL /100	

Mucho éxito en su examen!

Análisis Real I - Examen 3

Problema 1: Supongamos que f es una función compleja medible en X , μ es una medida positiva en X , y

$$\varphi(p) = \int_x |f|^p d\mu = \|f\|_p^p. \quad (0 < p < \infty).$$

Sea $E = \{p : \varphi(p) < \infty\}$. Supongamos que $\|f\|_\infty > 0$.

(a) Si $r < p < s$, $r \in E$, y $s \in E$, demuestra que $p \in E$.

(b) Prueba que $\log \varphi$ es convexa en el interior de E y que φ es continua en E .

Análisis Real I - Examen 3

continuación del problema 1

(c) Si $r < p < s$, demuestra que $\|f\|_p \leq \max(\|f\|_r, \|f\|_s)$. Muestra que esto implica la inclusión

$$L^r(\mu) \cap L^s(\mu) \subset L^p(\mu).$$

(d) Supongamos que $\|f\|_r < \infty$ para algún $r < \infty$. Demuestra que

$$\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty \text{ cuando } p \rightarrow \infty.$$

Análisis Real I - Examen 3

Problema 2 Sea \mathcal{S} la clase de todas las funciones f en \mathbb{R} que tienen la siguiente propiedad: f es infinitamente diferenciable, y existen números $A_{m,n}(f) < \infty$ para $m, n = 0, 1, 2, \dots$ (dependen de f solamente) tales que

$$|x^n D^m f(x)| \leq A_{m,n}(f), \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Aquí D es el operador diferenciación. Demuestra que la transformada de Fourier mapea \mathcal{S} en \mathcal{S} .

Análisis Real I - Examen 3

Problema 3: Supongamos que $1 \leq p \leq \infty$, y que q es el esponente conjugado de p . Supongamos que μ es una medida positiva σ -finita y que g es una función medible tal que $fg \in L^1(\mu)$ para cada $f \in L^p(\mu)$. Prueba que $g \in L^q(\mu)$.

Análisis Real I - Examen 3

Problema 4: Supongamos que X consiste de dos puntos a y b ; define $\mu(\{a\}) = 1, \mu(\{b\}) = \mu(X) = \infty$, y $\mu(\emptyset) = 0$. es cierto que para esta medida μ , $L^\infty(\mu)$ es el espacio dual de $L^1(\mu)$?